

Josera

Fohlen & Stute

Musli dedykowane kompleksowemu
żywieniu klaczy i źrebiąt.

- Specjalnie opracowany jako optymalne żywienie dla klaczy i dla dobrego wzrostu źrebiąt
- Niezbędne aminokwasy z wysokiej jakości źródeł białka utrzymują optymalną kondycję hodowlaną, wspierają produkcję mleka i płodność klaczy
- Optymalne właściwości mineralne dla rozwoju mocnych kości, ścięgien i chrząstek



Wpływ na:	Składniki analityczne:		
Wzrost, utrzymanie, regenerację	Białko surowe	%	18,0
Siłę, wytrzymałość, zdrową skórę	Oleje i tłuszcze surowe	%	7,5
Trawienie, jelita	Włókno surowe	%	5,7
Dostawę minerałów	Popiół surowy	%	8,5
Kości, nerwy, krzepnięcie krwi	Wapń	%	1,4
Kości, metabolizm energetyczny	Fosfor	%	0,6
Równowagę wodno-elektrolitową, nerwy	Sód	%	0,6
Mięśnie i nerwy	Magnez	%	0,2
Każdy proces metaboliczny	Energia strawna (DE)	MJ/kg	12,6
Dostarczanie aminokwasów	Strawne białko surowe (dXP)	%	13,5
Energję i siłę	Skrobia	%	30,0
Szybko dostępną energję	Cukier	%	5,0
Rozwój mięśni	Lizyna	g/kg	8,5

Wpływ na:	Dodatki: dodatki odżywcze na kg:		
Odporność na infekcje, wzrok	Witamina A (3a672a)	I. U.	20.000
Równowagę mineralną	Witamina D3 (3a671)	I. U.	2.800
Ochronę komórek, płodność, mięśnie	Witamina E / all-rac-alpha-tocopheryl acetate (3a700)	mg	230
Metabolizm energetyczny, funkcje nerwowe	Witamina B1 (3a821)	mg	12
Liczne procesy metaboliczne, oczy	Witamina B2 (3a825i)	mg	7
Metabolizm białek	Witamina B6 (3a831)	mg	6
Tworzenie krwi, wzrost	Witamina B12	mcg	46
Metabolizm, skórę	Niacyna (3a314)	mg	41
Metabolizm, odporność na infekcje	Calcium D-pantothenate (3a841)	mg	23
Tworzenie krwi, produkcję przeciwciał	Kwas foliowy (3a316)	mg	2
Metabolizm energetyczny, skórę, kopyta	Biotyna (3a880)	mcg	1.200
Metabolizm tłuszczów, nerwy	Chlorek choline (3a890)	mg	460
Zdrową skórę, wzrok, metabolizm	Cynk jako chelat cynku wodzanu glicyny (ciało stałe) (3b607)	mg	75
patrz wyżej	Cynk jako tlenek cynku (3b603)	mg	75
Skórę, kości, metabolizm	Mangan jako tlenek manganu(II) (3b502)	mg	110
Tworzenie krwi, tworzenie chrząstki	Miedź jako chelat miedzi(II) wodzanu glicyny (ciało stałe) (3b413)	mg	30
patrz wyżej	Miedź jako pięciowodny siarczan miedzi(II) (3b405)	mg	30
Tarzyć, metabolizm energetyczny	Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202)	mg	1
Ochronę komórek	Selen jako selenin sodu (3b801)	mg	0,8
Wzrost źrebiąt	Żelazo jako monohydrat siarczany żelaza(II) (3b103)	mg	170

Dane do obliczenia bilansu przepływu materiałów (DüV, maj 2017): 2,9% Azotu (N) | 1,4% Fosforanu (P2O5)

**Wspiera płodność klaczy
i produkcję mleka**

Optymalny rozwój źrebiąt

**Dodatkowa miedź, biotyna
i selen**

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni

Skład: płatki jęczmienne, poddane obróbce hydrotermicznej 26,4%; płatki kukurydziane, poddane obróbce hydrotermicznej 20%; płatki soi, poddane obróbce hydrotermicznej 20%; siemię lniane ekstrahowane 15%; melasa 3,3%; miazga jabłkowa 3,6%; otręby pszenne 3%; drożdże 2,1%; węglan wapnia 2%; chlorek sodu 1,5%; rafinowany olej roślinny 1,4%; fosforan jednowapniowy 0,5%.

Sposób użycia: W związku z wyższą zawartością pierwiastków śladowych, w porównaniu do pasz pełnoporcjowych, ta karma uzupełniająca dla koni może stanowić do 50 % całkowitej dziennej racji. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zalecenia żywieniowe:

W przypadku stosowania siana jako jedyną paszę uzupełniającą:

Na jedno źrebię dziennie (o wadze około 600 kg u dorosłego konia): od 2. do 12. miesiąca życia: 0,5–2,5 kg Josera Fohlen & Stute. Rekomendowana dzienna dawka paszy dla jednej klaczy o wadze 600 kg: od 8. miesiąca ciąży do porodu: około 1,5 kg Josera Fohlen & Stute od 1. do 3. miesiąca laktacji: około 4 kg Josera Fohlen & Stute od 4. do 5. miesiąca laktacji: 4–2,5 kg Josera Fohlen & Stute.

W przypadku podawania mniejszych ilości paszy zalecamy uzupełnienie jej o Josera Joker Mineral lub Josera Kraut & Rüben Mineral. 1 litr Josera Fohlen & Stute = około 500 g.

Dostępne w: 20 kg